

# APETIL PLUS®

Pantéthine / Carnitine / Cyproheptadine

## COMPOSITION

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Pantéthine .....                      | 500 mg       |
| Carnitine (Chlorure de).....          | 1500 mg      |
| Cyproheptadine (Chlorhydrate de)..... | 22,5 mg      |
| Excipients.....                       | q.s.p 100 ml |

Excipient à effet notoire: Saccharose

## INDICATIONS

- Anorexie primitive et secondaire suite à une maladie infectieuse, métabolique ou endocrinienne;
- Insuffisance pondérale.

## CONTRE-INDICATIONS

- Sujet présentant une hypersensibilité à l'un des composants.
- Durant le traitement par IMAO;
- Le glaucome;
- Le syndrome de rétention urinaire;
- En cas d'occlusion intestinale.

## MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

A utiliser avec prudence dans le traitement de cardiopathie, d'hypertension, d'hyperthyroïdie et d'asthme.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sucre : 2,50 g par cuillerée à café de sirop.

Comme pour tous les autres médicaments, ne pas laisser la préparation à la portée des enfants.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ne pas administrer le produit pendant la grossesse, pendant l'allaitement, dans les cas de prématurités, dans la période néonatale et dans la première enfance. Administrer seulement si cela est nécessaire et surtout sur avis du médecin.

## VIGILANCE ET CONDUITE

Eviter les activités nécessitant vigilance et coordination telles que conduite d'automobiles ou utilisation de machines et d'engins mécaniques.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Eviter la consommation d'alcool durant le traitement du fait de la présence de la cyproheptadine : cette association entraîne une dépression du système nerveux.

## EFFETS INDESIRABLES

Avec l'usage de la cyproheptadine dans les doses notamment supérieures à celles administrées avec APETIL PLUS®, il a été signalé de rares cas de vertiges, de sécheresse buccale, de céphalées, de nausées et vomissements, d'éruptions cutanées sur base allergique ou de photosensibilisation et exceptionnellement des symptômes de stimulation du SNC, d'hypertension, d'arythmies cardiaques, de dyscrasie hématologique.

Des cas de bouleversement ont été rapportés chez des patients, avec ou sans antécédent d'activité convulsive qui avaient reçu la lévocarnitine par voie orale ou intraveineuse.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Voie orale. Agiter le flacon avant utilisation.

# APETIL PLUS®

Pantéthine / Carnitine / Cyproheptadine

## COMPOSITION

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Pantéthine.....                   | 500 mg        |
| Carnitine chloride.....           | 1 500 mg      |
| Cyproheptadine hydrochloride..... | 22.5 mg       |
| Excipients.....                   | s.q.f. 100 ml |

Excipient with known effect : Saccharose

## INDICATIONS

- Primitive and secondary anorexia following an infectious, metabolic or endocrine illness;
- Ponderal insufficiency.

## CONTRA-INDICATIONS

- People presenting a hypersensitivity to one of the components;
- During the treatment by MAOI;
- Glaucoma;
- Urinary retention;
- In case of intestinal obstruction.

## WARNINGS AND PRECAUTIONS OF USE

To use with caution in patients with cardiopathy, hypertension, hyperthyroidism and asthma.

Due to the presence of saccharose, don't administrate this medicine in case of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrose-isomaltase insufficiency.

In case of diabetes or low-carbohydrate diet, take account in the daily ration of the sugar content: 2.50 g per teaspoonful of syrup.

As all other medicines, don't let the preparation accessible to children.

## PREGNANCY AND BREASTFEEDING

Don't administrate the product during pregnancy, during breast-feeding, in cases of prematurity, during the neonatal period and in the first childhood. Administrate only if it is necessary and especially on medical advice.

## VIGILANCE AND DRIVING

Avoid activities requiring alertness and coordination such as driving cars or operating machinery and mechanical appliances.

## INTERACTIONS WITH OTHER DRUGS

Avoid the consumption of the alcohol during the treatment because of the presence of the cyproheptadine: this association can lead to depression of the nervous system.

## SIDE EFFECTS

With the use of the cyproheptadine in notably superior dosages those administrated with APETIL PLUS®, it has been reported rare cases of dizziness, dryness of the mouth, headache, nausea and vomiting, skin rash on allergic base or from photosensitization and exceptionally symptoms of stimulation of the SNC, of hypertension, of cardiac arrhythmia, of hematologic discrasia.

Cases of upheaval have been brought in patients, with or without antecedent of convulsive activity, who had received levocarnitine by mouth or intravenous.

## DOSAGE AND MODE OF USE

Oral route. Shake the bottle before use.

In children, the daily dose is 0.750 g to 1 g of syrup per kg of body weight distributed in 2

Chez l'enfant, la dose journalière est de 0,750 g à 1 g de sirop par kg de poids corporel, répartie en 2 à 3 prises.

A partir de 6 ans, est suffisante une dose journalière de 0,5 g à 0,750 g par kg de poids corporel modifiable suivant l'avis du médecin.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Jusqu'à 10 kg                        | = 2,5 ml, soit ½ cuillère à café 2 – 3 fois / jour      |
| De 10 à 15 kg (2 – 3 ans)            | = 5 ml, soit 1 cuillère à café 2 – 3 fois / jour        |
| De 15 à 20 kg (3 – 6 ans)            | = 7,5 ml, soit 1 et ½ cuillère à café 2 – 3 fois / jour |
| Plus de 20 kg (7 ans et plus) Adulte | = 10 ml, soit 2 cuillères à café 2 – 3 fois / jour      |

#### FORME ET PRESENTATION

Sirop, flacon de 100 ml avec gobelet doseur.

#### CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 30°C

**Vente libre**

**AMM n° E-2006-021**

to 3 administrations.

From 6 years, is sufficient a daily dose of 0.5 g to 0.750 g of syrup per kg of body weight, changed following the doctor's advice.

|   |  |
|---|--|
| Until 10 kg                             | 2.5 ml = ½ teaspoonful, 2 – 3 times/ day       |
| 10 to 15 kg (2 – 3 years old)           | 5 ml = 1 teaspoonful, 2 – 3 times/ day         |
| 15 to 20 kg (3 – 6 years old)           | 7.5 ml = 1 and ½ teaspoonful, 2 – 3 times/ day |
| Over 20 kg (7 years old and over) Adult | 10 ml = 2 teaspoonfuls, 2 – 3 times/ day       |

#### PRESENTATION

Syrup, 100 ml bottle, with a measuring cup.

#### STORING CONDITIONS

Store below 30°C

**OTC drug**

**A.M.M : n° E-2006- 021**

**Date de révision de la notice: septembre 2014**

**Leaflet revision date: september 2014**

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact  
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle



25 B.P. 276 Abidjan 25 - Côte d'Ivoire

Email : olea@umaline.com