

C-PLUS® bain de bouche / C PLUS® Spray

BENZYDAMINE CHLORHYDRATE

FORMES ET PRESENTATIONS

C-PLUS® collutoire :

- Solution pour bain de bouche : Flacon de 120 ml
- Spray : Flacon de 50 ml

COMPOSITION

Chlorhydrate de Benzydamine	150 mg
Excipients q.s.p.	100 ml

INDICATIONS

Affections Odontostomatologiques :
Gingivites, aphtes, stomatites, parodontoses et traitement post chirurgical.
Affections Oto-Rhino-Laryngologiques :
Angines, Laryngites, Amygdalites.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la préparation.

PRECAUTION D'EMPLOI

L'utilisation prolongée de préparations topiques peut provoquer des phénomènes de sensibilisation qui nécessitent la suspension du traitement.

EFFETS INDESIRABLES

Aucun

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Pas de contre-indication.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Aucune

MODE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Chez le petit enfant de deux ans et plus, privilégier le spray aux autres formes.

Afin de ne pas diminuer l'efficacité de C-PLUS® Collutoire, éviter d'utiliser le produit immédiatement avant de boire ou manger.

- Solution pour bain de bouche : une cuillère à soupe, pure ou diluée dans un peu d'eau : 2 à 3 rinçages par jour.
- Spray : 4 à 8 pulvérisations jusqu'à 6 fois par jour. (1 pulvérisation équivaut à 0,17 ml de solution).

Amorcer la pompe manuelle.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25 °C

Vente libre

C-PLUS® collutoire, Solution pour bain de bouche, flacon de 120 ml

A.M.M. : n°2006-022

C-PLUS® collutoire, Spray, flacon de 50 ml

A.M.M. : n°2007-238

C-PLUS® Mouth wash solution/ CPLUS® Spray

BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE

FORMS AND PRESENTATIONS

C-PLUS® Antiseptic throat preparation:

- Mouth wash solution: 120 ml bottle
- Spray: 50 ml bottle

COMPOSITION

Benzydamine hydrochloride	150 mg
Excipients	s.q.f 100 ml

INDICATIONS

Odontostomatologic disorders: Gingivitis, aphta, stomatitis, parodontosis and post surgical treatment.

ENT disorders: Angina, Laryngitis, Tonsillitis.

CONTRA-INDICATIONS

Hypersensitivity to the preparation.

PRECAUTIONS OF USE

A prolonged use of the topical preparations may cause sensitization phenomena that require to interrupt the treatment.

SIDE EFFECTS

Not any one.

PREGNANCY AND LACTATION

No contra-indication.

DRUG INTERACTION

Not any one.

MODE OF USE AND POSOLOGY

For children two years of age and older, privilege the spray to the other forms. In order not to decrease the efficiency of C-PLUS® Antiseptic throat preparation, avoid using the product immediately before drinking or eating.

- Mouth wash solution: 1 tablespoonful, pure or diluted in a small quantity of water: 2 to 3 mouth washes a day.
- Spray: 4 to 8 pulverizations, 2 to 6 times / day. (1pulverization is equivalent to 0.17 ml of solution).

Prime the manual pump.

STORING CONDITIONS

Below 25 °C

OTC drug

C-PLUS® Antiseptic throat preparation, Mouth wash solution, 120 ml bottle

A.M.M. : n°2006-022

C-PLUS® Antiseptic throat preparation, Spray, 50 ml bottle

A.M.M. : n°2007-238

Date de révision de la notice: septembre 2014 Leaflet revision date: September 2014

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle



25 B.P. 276 Abidjan 25 - Côte d'Ivoire
Email : olea@umaline.com

