



# METRODEX®

Métronidazole

## FORMES ET PRESENTATIONS :

METRODEX ® Comprimés à 500 mg, boîte de 20.

METRODEX ® Suspension buvable, flacon de 120 ml avec gobelet doseur.

## COMPOSITION :

### Comprimé

Métronidazole.....500 mg

Excipients.....q.s.p. 1 comprimé

### Suspension buvable pédiatrique

Métronidazole benzoate .....4 g

(correspondant à 2,5 g de Métronidazole base)

Excipient.....q.s.p. 100 ml

Excipient à effet notoire : Saccharose

## INDICATIONS :

### • Traitement curatif des infections dues aux germes sensibles :

-Amibiases intestinales et hépatiques ;

-Trichomonas urogénitales ;

-Vaginites non spécifiques ;

-Lambliaoses ;

-Infections à germes anaérobies (le traitement oral est utilisé en première intention ou en relais de la thérapie par voie injectable)

### • Traitement préventif des infections post-opératoires à germes anaérobies sensibles

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie orale. Respecter la prescription médicale.

### Amibiase :

-**Adulte** : 1,5 g par jour, en 3 prises (Comprimé de 500 mg).

-**Enfant** : 30 à 40 mg/kg/jour, en 3 prises (Suspension buvable).

Dans l'amibiase hépatique, au stade abcédé, l'évacuation de l'abcès doit être effectuée conjointement au traitement par le métronidazole.

La durée du traitement est de 7 jours consécutifs

### Trichomonase :

-**Chez la femme (urétrites et vaginites à trichomonas) :**

Comprimé à 500 mg : traitement à dose unique de 2 g en une seule prise (4 Comprimés).

Que le partenaire présente ou non des signes cliniques d'infestation à Trichomonas vaginalis, il importe qu'il soit traité concurremment, même en l'absence d'une réponse positive du laboratoire.

-**Chez l'homme (urétrites à trichomonas) :**

Comprimé à 500 mg : 500 mg en deux prises pendant 10 jours.

Très exceptionnellement, la dose journalière peut être élevée à 750 mg ou à 1 g.

### Lambliaose :

-**Adulte** : 750 mg à 1 g par jour (Comprimé à 500 mg).

-**Enfant de 10 à 15 ans** : 500 mg par jour (Comprimé à 500 mg) ou 4 gobelets doseurs de 5 ml / jour (Suspension buvable).

-**Enfant de 5 – 10 ans** : 3 gobelets doseurs de 5 ml /jour, soit 375 mg/jr (Suspension

buvable).

-**Enfant de 2 – 5 ans** : 2 gobelets doseurs de 5 ml / jour, soit 250 mg/jr (Suspension buvable).

La durée de traitement est de 5 jours consécutifs.

### Vaginites non spécifiques :

-**Adulte** : 500 mg, 2 fois par jour pendant 7 jours (Comprimé à 500 mg).

Un traitement simultané du partenaire doit être pratiqué.

### Infections à germes anaérobies :

-**Adulte** : 1 à 1,5 g / jour (Comprimé à 500 mg).

-**Enfant** : 20 à 30 mg / kg / jour (Suspension buvable).

Chimioprophylaxie chirurgicale :

Le métronidazole doit être associé à un produit actif sur les entérobactéries.

La dose est administrée toutes les 8 heures, le traitement étant commencé 48 heures environ avant l'intervention, et la dernière dose étant administrée au plus tard 12 heures avant l'intervention.

Le but de cette chimioprophylaxie étant de réduire l'inoculum bactérien dans le tube digestif au moment de l'intervention, il est inutile de poursuivre l'antibiotique en post – opératoire.

-**Adulte** : 1 à 1,5 g / jour

-**Enfant** : 20 à 30 mg / kg / jour

## CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité aux imidazolés.

La consommation d'alcool doit absolument être évitée durant le traitement.

## MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS :

### Mises en garde

-Interrompre le traitement en cas d'ataxie, de vertige, de confusion mentale.

-Risque d'aggravation de l'état neurologique chez les malades atteints d'affections neurologiques centrales et périphériques sévères, fixées ou évolutives.

-Eviter les boissons alcoolisées (effet antabuse)

### Précautions d'emploi

-Contrôler la formule leucocytaire en cas d'antécédents de dyscrasie sanguine ou de traitement à forte dose et/ou prolongé. En cas de leucopénie, l'opportunité de la poursuite du traitement dépend de la gravité de l'infection.

-En cas de diabète ou de régime hypocalorique, tenir compte d'un apport de 3 g de sucre par cuillère à café (5ml) de suspension buvable.

## INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU EXAMENS BIOLOGIQUES:

Associations déconseillées :

-Disulfirame : L'association au disulfirame peut entraîner des bouffées délirantes ou un état confusionnel.

-Alcool : effet antabuse (chaleur, rougeur, vomissement et tachycardie). Eviter la prise de boisson alcoolisée ou de médicaments contenant de l'alcool

Association nécessitant des précautions d'emploi :

-Anticoagulants oraux (décrit pour la warfarine) : augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral



-Vecuronium (curarisant non dépolarisant) : le métronidazole potentialise l'action du vécuronium

Association à prendre en compte :

-5 fluoro – uracile : augmentation de la toxicité du 5 fluoro – uracile par diminution de sa clairance

Examens paracliniques

Le métronidazole peut immobiliser les tréponèmes et donc faussement positiver un test de Nelson

## **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

### **Grossesse**

METRODEX ® ne doit en aucun cas être pris durant les trois premiers mois de la grossesse. Pour les second et troisième trimestres de grossesse, seul votre médecin pourra décider si le traitement doit être introduit.

### **Allaitement**

Si vous avez besoin d'un traitement par METRODEX ® durant l'allaitement, demandez conseil à votre médecin

### **EFFETS SECONDAIRES:**

- Troubles digestifs bénins : nausées, goût métallique dans la bouche, anorexie, crampes épigastriques, vomissements, diarrhée.
- Cas exceptionnels de pancréatites réversibles à l'arrêt du traitement.
- Signes cutanéomuqueux : urticaire, bouffées vasomotrices, prurit, glossite avec sensation de sécheresse de la bouche.

• Signes nerveux : céphalées, vertiges, convulsions, confusion mentale.

• A forte posologie et /ou en cas de traitement prolongé : leucopénies, neuropathies sensitives périphériques, qui régressent toujours à l'arrêt du traitement

• Une coloration brune rougeâtre des urines peut être observée.

### **SURDOSAGE :**

Vomissements, ataxie et légère désorientation.

En cas de surdosage massif, le traitement est symptomatique.

### **PHARMACODYNAMIE**

Classe pharmacothérapeutique : antibiotique, antiparasitaire de la famille des nitro-5imidazolés.

### **CONDITIONS DE CONSERVATION :**

METRODEX ® Comprimés: Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 25°C.

METRODEX ® Suspension buvable: Conserver à une température inférieure à 25°C

### **Liste I**

**METRODEX ® Comprimés A.M.M : n° E-2011-119**

**METRODEX ® Suspension buvable A.M.M : n° E-2007-318**

**Date de révision de la notice: avril 2015**

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact  
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle



25 B.P. 276 Abidjan 25 - Côte d'Ivoire  
Email : olea@umaline.com