

SEPTILAIT®

Irgasan DP 300

SEPTILAIT®

Irgasan DP 300

COMPOSITION

Irgasan DP 300.....0,3 g
Excipients q.s.p.100 ml

PROPRIETES

Solution antiseptique moussante, bactéricide et fongicide.

INDICATIONS

*En Médecine Générale :

- Hémorroïdes;
- Brûlures;
- Mycoses;
- Inflammation et irritation dues aux produits de nettoyage.

*En Pédiatrie

- Bain de bébé;
- Vaginites et Prurits vulvaires des nourrissons et bébés;
- Activité sportive : pour les enfants qui fréquentent les piscines publiques.

*En Gynécologie et Urologie

- Prurit anal et vulvaire;
- En prévention et comme coadjuvant dans la thérapie du *Trichomonas vaginalis* et *Candida albicans*;
- Cystites et urétrites.

CONTRE-INDICATIONS

Sensibilité à l'un des composants (ou sensibilité au groupe).

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce produit s'utilise pur ou dilué en application locale suivie d'un rinçage.

*Pour l'hygiène intime externe : verser le contenu d'un bouchon dans ¾ de litre d'eau tiède. Prolonger la toilette pendant 3 à 4 minutes.

*En bain : verser les ¾ d'un bouchon dans de l'eau du bain.

*En douche : verser sur un gant de toilette mouillé le contenu d'un bouchon et se frictionner le corps.

FORME ET PRESENTATION

Solution à usage externe - Flacon de 125 ml.

Solution à usage externe - Flacon de 250 ml.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 30°C.

SEPTILAIT®, Flacon de 125 ml

A.M.M. : n° E-2005- 218

SEPTILAIT®, Flacon de 250 ml

A.M.M. : n° E-2008-086

Vente libre

COMPOSITION

Irgasan DP 300.....0.3 g
Excipients s.q.f.100 ml

PROPERTIES

Antiseptic lathering solution having bactericidal and fungicidal activity.

INDICATIONS

* In General Practice

- Hemorrhoids;
- Burns;
- Mycosis;
- Inflammation and irritation caused by cleaning products.

* In Pediatrics

- Baby bath;
- Vaginitis and vulvar itching of infants and babies;
- Sports activity: for children attending public pools.

* In Gynecology and Urology

- Anal and vulvar pruritus;
- For prevention and as co-adjuvant in the therapy against *Trichomonas vaginalis* and *Candida albicans*;
- Cystitis and urethritis.

CONTRA-INDICATIONS

Sensitivity to any component (or sensitivity to the group).

DOSAGE AND MODE OF USE

This medicine must be used pure or diluted in local application followed by rinsing.

* For external intimate hygiene : pour the content of a plug in ¾ of a liter of warm water. Extend the toilet for 3 to 4 minutes.

* For bathing : pour ¾ of a plug in the bath water.

* For showering : pour over a washcloth the content of a cap and rub the body.

FORM AND PRESENTATION

Solution for external use - 125 ml bottle.

Solution for external use - 250 ml bottle.

STORING CONDITIONS

Store below 30°C.

SEPTILAIT®, 125 ml bottle

A.M.M. : n° E-2005- 218

SEPTILAIT®, 250 ml bottle

A.M.M. : n° E-2008-086

OTC drug

Date de révision de la notice: septembre 2014

Leaflet revision date: september 2014

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle



25 B.P. 276 Abidjan 25 - Côte d'Ivoire
Email : olea@umaline.com