

VERIBEN®

Albendazole

COMPOSITION

Comprimé

Albendazole.....400 mg

Excipients q.s.p.....1 comprimé

Excipient à effet notoire : lactose

Suspension buvable à 4%

Albendazole.....4 g

Excipients q.s.p.....100 ml

Excipients à effet notoire : acide benzoïque, sorbate de potassium et acide sorbique.

INDICATIONS :

Antiparasitaire préconisé dans l'oxyurose, l'ascaridiose, l'ankylostomose, la trichocéphalose, l'anguillulose, la trichinellose, les giardiases de l'enfant et les taeniasis (dans ce cas, le traitement par l'Albendazole ne doit être envisagé qu'en cas de parasitoses associées sensibles à l'albendazole).

CONTRE-INDICATIONS

-Femme enceinte;

-Hypersensibilité à l'Albendazole ou à l'un des autres composants.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Indications	Doses	Durée du traitement
Ascaridiose Ankylostomose Trichocéphalose	Enfant de 1 à 6 ans : 5 ml (1/2 flacon de 10 ml) de suspension Adulte et Enfant de plus de 6 ans : 1 flacon de 10 ml de suspension ou 1 comprimé de 400 mg	1 prise unique **
Anguillulose Taeniasis (associé à d'autres parasitoses)	Enfant âgé de 2 à 6 ans : 1 flacon de 10 ml de suspension Adulte et Enfant de plus de 6 ans : 1 flacon de 10 ml de suspension ou 1 comprimé de 400 mg	1 prise quotidienne pendant 3 jours consécutifs **
Oxyurose*	Enfant de 1 à 6 ans : 5 ml (1/2 flacon de 10 ml) de suspension Adulte et Enfant de plus de 6 ans : 1 flacon de 10 ml de suspension ou 1 comprimé de 400 mg	1 prise unique à répéter 7 jours plus tard
Giardiose	Enfant de 1 à 6 ans : 1 flacon de 10 ml de suspension Enfant de plus de 6 ans : 1 flacon de 10 ml de suspension ou 1 comprimé de 400 mg	1 prise quotidienne pendant 5 jours consécutifs
Trichinellose	Enfant : 15 mg/kg/jour, répartis en 2 prises Adulte : 800 mg/jour soit 1 flacon de 10 ml de suspension ou 1 comprimé de 400 mg, 2 fois/jour	1 prise le matin et 1 prise le soir pendant 10 à 15 jours consécutifs, en fonction de la sévérité de la symptomatologie et de la précocité de la prise en charge thérapeutique

VERIBEN®

Albendazole

COMPOSITION

Tablet

Albendazole.....400 mg

Excipients s.q.f.....1 tablet

Excipient with known effect: lactose

Oral suspension at 4%

Albendazole.....4 g

Excipients s.q.f.....100 ml

Excipients with known effect : benzoic acid, potassium sorbate and sorbic acid.

INDICATIONS

Antiparasitic drug recommended in: oxyuriasis, ascariasis, ankylostomiasis, trichuriasis, anguilluliasis, trichinosis, child's giardiasis and taeniasis (in the last case the treatment by albendazole is done if there are other sensitive parasitosis associated).

CONTRA-INDICATIONS

-Hypersensitivity to Albendazole or to one of the other components;

-Pregnancy.

DOSAGE AND MODE OF USE

Dosage

Strictly comply with the prescription from your doctor.

Indications	Doses	Period of treatment
Ascariidiasis Ankylostomiasis Trichocephalosis	Infant from 1 to 6 years old: 5 ml (1/2 10 ml bottle) of suspension Adult and Infant over 6 years old: 10 ml bottle of suspension or one 400 mg tablet	Single dose **
Anguilluliasis Taeniasis (associated with other parasitosis)	Infant between 2 and 6 years old: 10 ml bottle of suspension Adult and Infant over 6 years old: 10 ml bottle of suspension or one 400 mg tablet	One daily dose to be repeated 3 successive days **
Oxyuriasis*	Infant from 1 to 6 years old: 5 ml (half 10 ml bottle) of suspension Adult and Infant over 6 years old: 10 ml bottle of suspension or one 400 mg tablet	One single dose to be repeated after 7 days
Giardiasis	Infant from 1 to 6 years old: 10 ml bottle of suspension Infant over 6 years old: 10 ml bottle of suspension or one 400 mg tablet	One daily dose to be repeated 5 successive days
Trichinosis	Infant : 15 mg/kg/day divided into 2 doses per day Adult : 800 mg/day, equivalent to one 400 mg tablet or 10 ml bottle of suspension, twice per day	One dose the morning and one the evening during 10 to 15 days according to the severity of symptoms and the precocity of the treatment

* Des mesures d'hygiène rigoureuses devront être imposées et l'entourage devra être également traité.

** En particulier en cas d'anguillulose, de trichocéphalose, de taeniasis, si le contrôle parasitaire effectué 3 semaines après le traitement est positif, une seconde cure peut être entreprise surtout en cas d'infestation massive.

Mode d'emploi

Voie orale.

Ni purge, ni jeûne préalables au traitement ne sont nécessaires.

Agiter le flacon avant emploi pour la suspension buvable.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- En raison de la possibilité de survenue de leucopénie, de pancytopenie ou d'augmentation des transaminases, en particulier lors de l'administration de doses élevées, comme c'est le cas dans le traitement de la trichinellose, une surveillance de la numération sanguine et des fonctions hépatiques est préconisée en début de traitement. Les patients souffrant d'atteintes hépatiques devraient être surveillés plus étroitement.

- Ne jamais laisser à la portée des enfants.

- Comprimé : En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être administré en cas de galactosémie congénitale; de syndrome de malabsorption du glucose, du galactose ou de déficit en lactase.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de grossesse et d'allaitement, demander l'avis de votre médecin ou pharmacien.

L'utilisation de VERIBEN® est déconseillée pendant la grossesse et durant l'allaitement.

EFFETS INDESIRABLES

Troubles gastro-intestinaux, céphalées et vertiges.

En cas de traitement prolongé : fièvre, alopecie réversible, leucopénie, pancytopenie, augmentation des transaminases, rash.

FORME ET PRESENTATION

VERIBEN® Comprimé de 400 mg, boîte de 1 ;

VERIBEN® Suspension buvable à 4 %, flacon de 10 ml.

CONDITIONS DE CONSERVATION:

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

VERIBEN® Comprimé à 400 mg

VERIBEN® Suspension buvable à 4%

A.M.M: n° E-2010-282

A.M.M: n° E-2006-1741

Liste II

* Strict measures of hygiene have to be imposed and the family circle must be treated.

** Particularly in case of anguilluliasis, trichocephalosis, taeniasis, if the parasitological examination of the stools is positive after 3 weeks of treatment, a second cure should be undertaken.

Mode of use

Oral route.

A purge or prior fasting are not necessary.

Shake the bottle before use.

WARNING AND PRECAUTIONS OF USE

-Because of the possibility of leucopenia, pancytopenia or increased transaminases, in particular in case of administration of high amounts, as is the case during the treatment of trichinosis, a monitoring of blood values and hepatic functions are recommended at the beginning of treatment. Patients with liver disease may be monitored more closely.

-Always keep out of reach of children.

-Tablet: As this drug contains lactose, it should not be used in case of congenital galactosemia, glucose-galactose malabsorption or lactase deficit.

PREGNANCY AND BREAST-FEEDING

In case of pregnancy and breast-feeding, consult your doctor or pharmacist.

The administration of VERIBEN® is inadvisable during pregnancy and breastfeeding.

SIDE EFFECTS

-Gastro-intestinal disorders, cephalaea and dizziness.

-During prolonged treatment: fever, reversible alopecia, leucopenia, pancytopenia, increased transaminases, rash.

FORM AND PRESENTATION

VERIBEN® 400 mg tablet, box of 1

VERIBEN® Oral suspension at 4%, 10 ml bottle.

STORING CONDITIONS

Store below 25°C.

VERIBEN® 400 mg tablet

VERIBEN® Oral suspension at 4%

A.M.M: n° E-2010-282

A.M.M: n° E-2006-1741

List II

Date de révision de la notice: septembre 2014 Leaflet revision date: september 2014

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle



25 B.P. 276 Abidjan 25 - Côte d'Ivoire
Email : olea@umaline.com